



RETİNA TOPLAR DAMAR TIKANIKLIĞI

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Çoğunlukla 60 -70 yaşlarında aniden görme azalması ile ortaya çıkmaktadır. Tutulan damarın yerine ve ortaya çıkan komplikasyonlara bağlı olarak görmedeki azalma az veya ciddi olabilir.

Retina toplar damar (ven) tıkanıklığının tipleri var mıdır?

Tek bir toplar damarda (retinal ven dalı) tıkanıklık olabilir veya ana toplar damarda (santral retinal ven) tıkanıklık olabilir.

Retina toplar damar (ven) tıkanıklığı risk faktörleri nelerdir?

Sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı (diyabet), glokom (göz tansiyonu) ve, kan yoğunluğunu artıran çeşitli kan hastalıkları risk faktörleridir.

Nasıl tetkik edilir?

Fundus floresein anjiyografi (FFA) ve OCT (Optik Koherenz Tomografi) kullanarak tetkik edilir. Bu testlerle tıkanıklığın miktarı, yeri, alandaki beslenmenin varlığı ve görme merkezinde sıvı birikmesi olup olmadığı değerlendirilir.

Dr. Ebru ACAR

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı

Park Yaşam Mavişehir Ofisleri Yalı Mah. 6523 Sokak 32/A Kat 3 No.313 Mavişehir Karşıyaka 35550 İzmir

GSM: (532) 474 4767 Muayenehane: (542) 352 4569 E-Posta: bilgi@drebruacar.com